

Cuestionario de detección de factores de riesgo cardiacos de muerte súbita en niños, antes de ser tratados con medicación estimulante para el TDAH: cualquier respuesta positiva requiere investigación o interconsulta a cardiología pediátrica.

Historia-Anamnesis	SÍ	NO
Disnea de esfuerzo (mayor que la de otros niños de esa edad) en ausencia de otra causa (asma, obesidad, estilo de vida sedentario)		
Baja tolerancia al ejercicio (comparada con otros niños) en ausencia de otra causa que lo justifique (asma, obesidad, estilo de vida sedentario)		
Síncope o convulsiones con ejercicio, sobresalto o susto		
Palpitaciones en relación con ejercicio		
H. ^ª familiar de muerte súbita o de causa desconocida, incluyendo síndrome de muerte súbita del lactante, ahogamiento o accidentes inexplicados en vehículo (parentesco de 1. ^{er} o 2. ^º grado)		
H.^ª personal o familiar (1.^{er} o 2.^º grado) de cardiopatía no isquémica	SÍ	NO
Sd. QT largo u otras arritmias familiares		
Sd. Wolff-Parkinson-White		
Miocardiópatías		
Trasplante cardiaco		
Hipertensión pulmonar		
Desfibrilador implantado		
Exploración física	SÍ	NO
Hipertensión arterial		
Soplo orgánico (no funcional)		
Esternotomía previa		
Otros hallazgos cardiológicos anormales		