INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS SOBRE LA…

Vacuna contra la gastroenteritis por ROTAVIRUS

Enero 2024

El rotavirus es un agente infeccioso que causa con frecuencia gastroenteritis en los niños pequeños. El cuadro clínico que provoca es habitualmente benigno, con vómitos, diarrea y a veces fiebre, aunque puede ser más intenso en los lactantes más pequeños, que en alguna ocasión precisan de ingreso hospitalario y, de forma excepcional en países como el nuestro, puede resultar fatal.

Prácticamente todos los niños, al llegar a los 2 años, han pasado al menos una gastroenteritis por este virus.

Hay dos vacunas orales (se beben) contra el rotavirus: Rotarix® y RotaTeq®. La vacunación completa se consigue con 2 dosis de Rotarix® o con 3 dosis de RotaTeq®. Cada dosis debe separarse de la siguiente, al menos, 1 mes.

La primera dosis se puede administrar desde las 6 semanas de edad (mes y medio) y no más tarde de las 12 semanas (días antes de cumplir 3 meses), pudiendo hacerse coincidir con las vacunaciones de calendario de los 2 y 4 meses. La última dosis ha de recibirse antes de las 24 semanas de vida para Rotarix® y antes de las 32 para RotaTeq®.

Está comprobado que es una vacuna segura y sin apenas efectos secundarios. Los más frecuentes son vómitos, diarrea y fiebre moderada, todos ellos leves. Se han comunicado casos aislados de broncoespasmo, urticaria y de invaginación intestinal tras la administración de esta vacuna. Esta última situación, muy rara, pero propia de los lactantes, el tiempo ha demostrado que no está relacionada con la vacuna.

La vacunación del rotavirus no está incluida en el calendario financiado infantil, salvo en Castilla y León, Galicia y Murcia, pero sí lo está para los muy prematuros en toda España. Para los demás, los padres que decidan administrarla a sus bebés deberán abonar su precio íntegro al adquirirla en la farmacia con receta médica. El costo de cada dosis es de 93,67 euros para el Rotarix® (vacunación completa 187,34 €) y de 69,50 euros para el RotaTeq® (vacunación completa 208,50 €).

Como las demás vacunas, si se administra (se recomienda que lo hagan profesionales sanitarios) debe anotarse la vacunación en la cartilla personal de vacunaciones y en el historial clínico del centro de salud o clínica.