

La meningitis es una enfermedad grave, en ocasiones mortal, que es muy poco frecuente en estos momentos en nuestro país.

El meningococo es el causante de la mayor parte de las meningitis bacterianas en niños y mayores, aunque no el único.

Hay meningococos de varias familias (serogrupos). Los que causan enfermedad con mayor frecuencia son el A, B, C, W, X e Y, y se distribuyen de forma diferente por los continentes del mundo.

En España, actualmente el más frecuente es el serogrupo B, aunque también hay C, muy disminuido tras la inclusión de la vacuna específica en el calendario infantil. En los últimos años se muestra un crecimiento de casos por los serogrupos W e Y.

Los adolescentes y adultos jóvenes son los habituales portadores faríngeos asintomáticos de estos gérmenes. Es decir, que algunos llevan el microbio en su garganta sin sufrir la enfermedad, pero lo pueden transmitir a otras personas.

Hay varios países europeos que han incorporado la vacuna tetravalente a su calendario del adolescente y Bélgica y los Países Bajos además en el primer año, para proteger al mismo tiempo frente a los meningococos A, C, W e Y (**MenACWY**). En España está también en calendario, siguiendo el acuerdo ministerial de administrar una dosis en la adolescencia. Algunas CC. AA. la incluyen, además, a los 12 meses de edad*.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) propone la sustitución, en el calendario oficial español, de la vacuna del meningococo C monovalente (**MenC**) de los 12 meses por **MenACWY**, además de la dosis de los 12 años.

Hay también algunos individuos que han de vacunarse por sufrir determinadas deficiencias de la inmunidad. En estas personas, la vacunación está financiada.

En España tenemos tres vacunas disponibles: **Nimenrix®**, **MenQuadfi®** y **Menveo®**. Cuestan todas igual: 54,64 €. **Nimenrix®** puede administrarse ya al mes y medio (6 semanas de vida), aunque, cuando se comienza a estas edades tempranas, son precisas más dosis para completar la vacunación; **MenQuadfi®** tiene admitida su aplicación con al menos 12 meses, y **Menveo®** está autorizada desde los 2 años en adelante.

Para su adquisición en farmacias se necesita receta médica.

* **MenACWY** está en calendario a los 12 meses en Andalucía, Castilla y León y en Melilla.